

## **Erată Book des ECN**

### **I. Greșeli de traducere și redactare**

#### **CARDIOLOGIE**

##### 2. Boala cardiacă ischemică

Pagina 43: BRS - este SUBdenivelare de ST, nu supra. Este tradus gresit din cartea originală.

**Pag. 60, înainte de tabel:**

- text ECN: „Etiologia de evocat în prezența unei subdenivelări a segmentului ST”
- ECN francez: „Etiologia de evocat în prezența unei supradenivelări a segmentului ST”

**Pag. 60, tabel:**

*Infarct pe cale de constituire:*

- text ECN: „Semn în oglindă (supradenivelare) = patognomonic”
- ECN francez: „Semn în oglindă (subdenivelare) = patognomonic”
- text ECN: „Subdenivelare focalizată la un teritoriu vascular”
- ECN francez: „Supradenivelare focalizată la un teritoriu vascular”
- text ECN: „Subdenivelare convexă în sus”
- ECN francez: „Supradenivelare convexă în sus”
- text ECN: „Subdenivelare a ST rezistentă la trinitrină”
- ECN francez: „Supradenivelare a ST rezistentă la trinitrină”

*Pericardită acută*

- text ECN: „Subdenivelare difuză”
- ECN francez: „Supradenivelare difuză”

*Tulburări de repolarizare secundară*

- text ECN: „tulburări de repolarizare secundară”
- ECN francez: „tulburări secundare de repolarizare”

**Pag. 61, Gazometrie arterială**

- text ECN: „cuplată cu dozarea lactazelor”
- ECN francez: „cuplată cu dozarea lactaților”

**Pag. 63, Dureri parietale**

- text ECN: „zona intercostală dificil de diagnosticat în perioada preeruptivă”
- corect: „zona zoster intercostală dificil de diagnosticat în perioada preeruptivă”

**Pag. 69, tabel Teritori ECG, inferolaterobazal**

- text ECN: „V<sub>5</sub>V<sub>6</sub>V<sub>7</sub>V<sub>8</sub>V<sub>9</sub> DI aVL DII DIII aVF”
- ECN francez: „V<sub>5</sub>V<sub>6</sub>V<sub>7</sub>V<sub>8</sub>V<sub>9</sub> DI aVL DII DIII aVF”

**Pag. 73, Management**

*Examinări complementare, ECG*

- text ECN: „cu excepția supradenivelării segmentului ST clasic, subdenivelarea și inversia undelor T”
- ECN francez: „cu excepția supradenivelării segmentului ST. Clasic, subdenivelare și inversia undelor T”
- text ECN: „Evoluție posibilă spre o undă Q”
- ECN francez: „Evoluție posibilă spre o undă q”

*Monitorizare, ECG*

- text ECN: „apariția unei unde Q”
- ECN francez: „apariția unei unde q”

**Pag. 128, Heparinele, Proprietăți**

- text ECN: „proporția anti-IIa/Xa trece de la 1 pentru heparine nefracționate la 3 pentru LMWH”
- corect: „proporția anti-IIa/Xa trece de la 3 pentru heparine nefracționate la 1 pentru LMWH” (pentru ca anterior scrie: pierderea lanțurilor lungi de heparină provoacă o pierdere parțială a efectului anti-IIa)

**Pag. 129, Farmacocinetica**

- text ECN: „plasmată”
- ECN francez: „plasmă”

**Pag. 131, tabel tranziția AVK-heparină**

- text ECN: coloana 1, linia 2 goală
- ECN francez: „prea scăzut”

**Pag. 132, tabel Produsele disponibile**

- text ECN: „Timp de acțiune”
- ECN francez: „Debutul acțiunii”

**3. Hipertensiunea arterială esențială**

**Pag. 55, tabel, Insuficiență renală**

- text ECN: „IES”
- ECN francez: „IEC”

**4. Insuficiență cardiacă**

**Pag. 1272, tabel Elemente specifice în funcție de patologii, linia 1, coloana 4**

- text ECN: „AP”
- corect: „AF” (activitate fizică)

**5. Tulburări de ritm și de conducere**

**Pag. 35, Unda P, hipertrofie atrială dreaptă**

- text ECN: „unda P $\geq$ 2,5 mV”
- corect: „unda P $\geq$ 0,25 mV” sau „unda P $\geq$ 2,5 mm”

**Pag. 41, I. Anomalii ale funcției sinusale, c. Tratament**

- text ECN: „implantarea unui stimulator cardiac și bradicardie simptomatică”
- ECN francez: „implantarea unui stimulator cardiacă în caz de bradicardie simptomatică”

**Pag. 42, c. Bloc atrioventricular de gradul trei, ECG**

- text ECN: „intervalul P/R $\leq$ 1”
- corect: „intervalul R/P $\leq$ 1”

**6. Valvulopatii mitrale, aortice**

**Pag. 112, I. Etiologie, Insuficiență mitrală acută, ischemică**

- text ECN: „prin fibroza ischemică a pilierului valvei mitrale mici, fie prin lipsa de coaptare a valvelor”
- ECN francez: „prin fibroza ischemică a pilierului cuspei mitrale mici, fie prin lipsa de coaptare a cuspelor”

**Pag.113, Bilanț paraclinic, Radiografia toracică**

- text ECN: „suprasarcină pulmonară: sindrom interstițial apialveolar”
- ECN francez: „suprasarcină pulmonară: sindrom interstițial apoi alveolar”

**7. Endocardita infectioasă**

**Pag. 100, Factori ecocardiografici**

- text ECN: „surgere aortică sau mitrală”
- ECN francez: „regurgitare aortică sau mitrală”

**Pag. 101, tabel Antibioterapia de primă intenție EI pe valvă nativă, Stafilococi meti-R**

- text ECN: „Vancomicyne 30 mg/kg/j”
- ECN francez: „Vancomycină 30 mg/kg/zi”
- text ECN: „Aminozide: gentamicină 3 mg/kg/j”
- ECN francez: „Aminozide: gentamicină 3 mg/lg/zi”

**- 8. Pericardita acută**

**Pag. 107, prima linie**

- text ECN: „tratamentul este strict asimptomatic”
- ECN francez: „tratamentul este strict simptomatic”

**9. Patologia aortei, arterelor periferice și patologia venoasă a membrelor inferioare**

**Pag. 81, I. Fiziopatologie**

- text ECN: „o eliberare de potasiu intracelular”
- ECN francez: „o eliberare a potasiului intracelular”

**Pag. 82, Bilanț paraclinic**

- text ECN: „diagnosticarea hiperkaliemiei, a acidozei metabolice, a creșterii enzimelor musculare (mioglobinemie, mioglobinurie) legate de o rabdomioliză, de o insuficiență renală, de o hiperuricemie, de o hipocalcemie”
- ECN francez: „diagnosticarea hiperkaliemiei, a acidozei metabolice, a creșterii enzimelor musculare (mioglobinemie, mioglobinurie) legată de o rabdomioliză, a insuficienței renale, a hiperuricemiei, a hipocalcemiciei”

**PNEUMOLOGIE**

**10. Dispnea acută și cronică, BPOC**

**Pag. 165, Schemă Managementul exacerbărilor acute ale BPOC cu criterii de gravitate**

- text ECN: „reanimare spontană”
- corect: „reanimare inițiată cât mai repede”

**Pag. 167, Tabel Oxigenoterapia, linia 3, coloana 1**

- text ECN: „Greutate”
- ECN francez: „Mobilitate”

**11. Tusea și hemoptizia la adult**

**Pag. 147, Tabel. Modul de ațiune al unor molecule antitusive**

- text ECN: „Levomepropazină”
- ECN francez: „Levopropizina”

**Pag. 181, Generalități**

- text ECN: „ORL sau digestivă (hematoasă)”
- ECN francez: „ORL sau digestivă (hematemeză)”

**Pag. 181, 4) cauze cardio-vasculare**

- text ECN: „anevrismul aortei toracice, fisură într-o bronchie”
- ECN francez: „anevrismul aortei toracice fisurat într-o bronchie”

**12. Alergiile respiratorii la adult**

**Pag. 148, Diagnosticul alergiei respiratorii la adult, anamneza**

- text ECN: „Riscul alergic este evaluat la 20-40% dacă unul dintre pacienți este alergic”
- ECN francez: „Riscul alergic este evaluat la 20-40% dacă unul dintre părinți este alergic”

**Pag. 152, Tabel Semne de gravitate a unui astm, Semne care impun o ventilație spontană**

- text ECN: Semne care impun o ventilație spontană
- corect: Semne care impun o ventilație asistată de prima intenție, cât mai urgent
- text ECN: „Tuburări de conștiință”
- corect: „Tulburări de conștiință”

**Pag. 155, stadiul 1, astm intermitent**

- text ECN: „exacerbări severe (de la câteva ore până la câteva zile)”
- ECN francez: „exacerbări scurte (de la câteva ore până la câteva zile)”

**13. Tuberculoza**

**Pag. 158, C-Atenție**

- text ECN: „De exemplu, se consideră viraj dacă prima IDR<5mm și a doua IDR $\geq$ 10mm sau dacă primul IDR $\geq$ 5mm dacă diametrul celui de-al doilea IDR depășește 10mm”
- ECN francez: „De exemplu, se consideră viraj dacă primul IDR<5 mm și al doilea IDR $\geq$ 10mm sau dacă primul IDR $\geq$ 5mm și diametrul celui de-al doilea IDR crește cum mai mult de 10 mm.”

**Pag.159, Primele două timp de 6 luni, ultimele două timp de 2 luni**

- text ECN: „Rifater (50 mg INH + 120 mg rifampicină +300 mg pirazinamidă): 1 cp pentru 12 kg de greutate (deci 5 cp pentru o greutate de 60 kg): de obicei 2 cp/zi.”
- ECN francez: „Rifater (50 mg INH + 120 mg rifampicină +300 mg pirazinamidă): 1 cp pentru 12 kg de greutate (deci 5 cp pentru o greutate de 60 kg). După 2 luni se înlocuiește cu Rifinah (150 mg INH + 300 mg rifampicină): de obicei 2 cp/zi”

**14. Infecțiile bronhopulmonare la adult**

**Pag. 169, Diagnosticul pneumopatiei la adult**

- text ECN: „semne fizice precum un sindrom de condensare clinică, o boală > 25/min ”
- ECN francez: „semne fizice precum un sindrom clinică de condensare, o polipnee > 25/min”

**Pag. 170, Indicații de spitalizare în secția de terapie intensivă sau de reanimare**

- text ECN: „anomalii metabolice sau hematologice: acidoză severă ( $f<7,3$ )”
- ECN francez: „anomalii metabolice sau hematologice: acidoză severă ( $pH<7,3$ )”

**Pag.189, 2) Radiografie toracică**

- text ECN: „fără bronhogramă aeriană”
- corect: „fără bronhogramă aerică”

## 15. Afecțiuni ale pleurei

**Pag. 183, chenar Diagnosticul de certitudine al unui pneumotorace**

- text ECN: „colabarea parțială sau completă a unui plămân apare ca o hiperclaritate omogenă”
- corect: „decolarea arțială sau completă a unui plămân apare ca o hipertransparență omogenă”

**Pag. 187, 4) Radiografia toracică**

- text ECN: „atelectazie completă a unui plămân prin obstrucția unei bronhii sușă”
- corect: „atelectazie completă a unui plămân prin obstrucția unei bronhii principale”

## **REANIMARE MEDICALĂ (MEDICINĂ DE URGENȚĂ)**

19. Evaluarea gravitației și investigarea complicațiilor precoce la un pacient cu traumatism toracic

**Pag. 208, ruptura de istm aortic**

- text ECN: „cobelârea trunchiului brahiocefalic stâng”
- ECN francez: „cobelârea bronhiei principale stângi”

20. Stopul cardio-respirator și starea de soc

**Pag. 221**

*Semne biologice*

- text ECN: „acidoză metabolică cu gol anionic crescut”
- corect: „acidoză metabolică cu gaură anionică crescută”
- text ECN: „citoliză și colestată hematică”
- ECN francez: „citoliză și colestată hepatică”

*Expansiune volemică*

- text ECN: „albumină în caz de hipoalbumină patentă”
- ECN francez: „albumină în caz de hipoalbuminemie patentă”

**Pag. 222, III.2.5. Tratamente adjuvante ale řocului septic, Corticoizi**

- text ECN: „în doze mici, pentru a compensa insuficiența renală funcțională”
- ECN francez: „în doze mici, pentru a compensa insuficiența suprarenală funcțională”

21. Tromboza venoasă profundă și embolia pulmonară

**Pag. 211, Tratamentul preventiv, I.3.1. Prevenția mecanică**

- text ECN: „ridicarea precoce din pat după operație, post-partumul pacientelor aflate la pat”
- ECN francez: „ridicarea precoce din pat după operație, în post-partum și în cazul pacienților aflați la pat”

**Pag. 213**

**II.4. Durata urmării tratamentului anticoagulant după un prim accident tromboembolic**

- text ECN: „în absența unui factor favorabil”
- ECN francez: „în absența unui factor favorizant”
- text ECN: „în prezența unui factor favorabil reversibil”
- ECN francez: „în prezența unui factor favorizant reversibil”

**II.6. Ancheta etiologică după tromboza venoasă profundă sau embolia pulmonară**

- text ECN: „dozaj de hemocisteinemie”
- ECN francez: „dozaj de homocisteinemie”

### ***II.7.3. Diagnostic – aspecte principale***

- text ECN: „Din acest moment (...) stabilirea clară a diagnosticului de tromboliză”
- ECN francez: „Din acel moment (...) stabilirea clară a deciziei de tromboliză”

### ***Pag. 214, II.7.4.1. Tratament simptomatic***

- text ECN: „noradrenalină în caz de hipertensiune arterială (0.5 mg/h intravenos cu seringă automată, adaptabil în etape de 5 µg/kg/min”
- ECN francez: „noradrenalină în caz de hipotensiune arterială (0.5 mg/h intravenos cu seringă automată, adaptabil în etape de 0.5 mg/h”

### ***Pag. 216, Figura 3***

- text ECN: „Suspiciune de EP nongravă (cu hipotensiune)”
- ECN francez: „Suspiciune de EP nongravă (fără hipotensiune)”

## **NEUROLOGIE**

### **22. Patologia vasculară cerebrală**

### ***Pag. 258, hematoamele intraparenchimatoase apărute sub tratament anticoagulant***

- text ECN: „concentrat de factori protrombinici (protrombină, factor VII, factor VIII, factor X „PPSB””
- corect: „PPSB (concentrat de factori protrombinici: protrombină, factor VII, factor IX, factor X)”

## **CHIRURGIE VISCERALĂ**

### **40. Patologia tumorală a tubului digestiv**

### ***Pag. 480, Confirmarea diagnostică și bilanțul extinderii, ecoendoscopie***

- markerii tumorali și evaluarea bilanțului contextului nu fac parte din ecoendoscopie
- ATENȚIE: asezarea în pagina poate genera interpretarea anterioară, dar ei sunt menționati distinct, fiind indispensabili pentru diagnostic

### ***Pag. 489, III. Principii de tratament, cancer de corp/coadă de pancreas***

- text ECN: „splenopancreatectomie céfalique”
- corect: „splenopancreatectomie corporeo-caudală”

### **45. Litiază biliară și complicațiile ei**

### ***Pag. 512, II.2. Angiolangita***

- text ECN: „angiolangita”
- ECN francez: „angiolangite”

## **GINECOLOGIE-OBSTETRICĂ**

### **Pag. 529**

#### *II. Etiologie*

- text ECN: „Risc de avort precoce”
- ECN francez: „Amenin’are de avort precoce”
- text ECN: „mola hidatidiformă”
- ECN francez: „mola hidatidiformă”

### ***Pag. 550, Monitorizarea în timpul travaliului***

- text ECN: (cardiotografie)”
- ECN francez: “(cardiotocografie)”

## 51. Patologia tumorală genitală pelvină și mamară la femei

**Pag. 600**

- text ECN: „tumora aparent complet rezecabilă spontan”
- corect: „tumora aparent complet rezecabilă de primă intenție”
- text ECN: „tumori aparent nerezectabile spontan”
- corect: „tumori aparent nerezecabile de primă intenție”

**Pag. 603, Cancerul mamar palpabil, depistat la examenul clinic**

- text ECN: „Depistarea la autoexaminare (...), cu atracție cutanată”
- ECN francez: „Depistarea la autoexaminare (...), cu retracție cutanată”

## **REUMATOLOGIE**

### 54. Osteoporoză

**Pag. 636, II. Erori de evitat**

- text ECN: „să nu se omită”
- corect: „să se omită”

**Pag. 639, Decizia terapeutică**

- text ECN: „greutate corporală < 19 kg/m<sup>2</sup>”
- ECN francez: „IMC< 19 kg/m<sup>2</sup> ”

### 55. Radiculalgia și sindromul de compresiune nervoasă

**Pag. 626, III. Obligatoriu de reținut, semiologia afecțiunii radiculare**

- text ECN: „L5 (TS: coapsă față externă, uneori pliu inghinal, coapsă față externă, anterior de maleola externă)”
- corect: „L5 (TS: coapsă față exernă, uneori pliu inghinal, gambă față externă, anterior de maleola externă)”

## **CHIRURGIE ORTOPEDICĂ**

### 58. Infecțiile acute ale părților moi

**Pag. 669**

#### *I. Diagnostic pozitiv, simptome locale*

- text ECN: „abces: colectare fluctuantă sau reținută”
- ECN francez: „abces: colecție fluctuană sau sub tensiune”

#### *IV. Îngrijire în situațiile de urgență*

- text ECN: „ablații articulare chirurgicale”
- ECN francez: „lavaj articular chirurgical”

**Pag. 670, flegmon digital**

- text ECN: „ablație prin cele 2 contraincizii de la extremități”
- ECN francez: „lavaj prin cele 2 contraincizii de la extremități”

## **CHIRURGIE ORL**

### 61. Otalgii și otite la copii și adulți

**Pag. 719**

#### *Forme clinice, Otita externă micotică*

- text ECN: „În cazul formelor bacteriene edemul este mai puțin vizibil”
- ECN francez: „Edemul este mai puțin vizibil decât în cazul formelor bacteriene”

#### *Forme clinice, Otita externă malignă*

- text ECN: „Evoluția merge spre o osteoliză a timpanului și a osului temporal”
- ECN francez: „Evouția merge spre o osteoliză a părții timpanice a temporalului și a osului temporal”

#### 63. Epistaxisul și tratamentul acestuia

##### **Pag. 737, Mijloacele terapeutice**

###### *Identificarea și limitarea factorilor agravanți, hipertensiune arterială*

- text ECN: „Poate fi legată de stres, dar poate indica o decompresie a unei HTA persistente”
- ECN francez: „Poate fi legată de stres, dar poate indica o decompensare a unei HTA persistente”

###### *Asigurarea hemostazei*

- text ECN: „compresia bidigitală și tamponarea suprafeței vestibulare: nu sunt necesare în cazul unui epistaxis cu abundență slabă”
- ECN francez: „compresia digitală și tamponarea suprafeței vestibulare: rezervate cazurilor de epistaxis anterior cu abundență slabă”

##### **Pag. 739, schemă Orientarea diagnosticului**

- text ECN: „trombofenie”
- ECN francez: „trombopenie”

#### **PSIHIATRIE**

#### 66. Tulburări psihice în perioada sarcinii și tulburări ale post-partumului

##### **Pag. 923, Tabel Management, Al doilea și al treilea trimestru**

- text ECN: „sismoterapie dinaintea anesteziei generale”
- ECN francez: „sismoterapie după bilanț preanestezie generală”

#### **PEDIATRIE**

#### 70. Diareea acută la copil, vărsăturile la sugar și copil

##### **Pag. 1052, Tabel Managementul deshidratării**

- text ECN: „Rehidratare intravenoasă sau, în caz de eșec, cu sonda nazogastrică”
- ECN francez: „În caz de eșec, rehidratare intravenoasă sau prin sondă nazogastrică”

##### **Pag. 1062, Tabel Vărsături acute, cauze metabolice**

- text ECN: „insuficiență renală acută”
- ECN francez: „insuficiență suprarenală acută”

#### 72. Infecții ale tractului respirator la copil

##### **Pag. 1069, Management**

- text ECN: „orice copil sub 3 ani diagnosticat cu angină”
- ECN francez: „orice copil mai mare de 3 ani diagnosticat cu angină”

#### 73. Alergii respiratorii la copii

##### **Pag. 1093, Tabel, Beta-2-mimetice cu durată scurtă de acțiune**

- text ECN: „<1 zi/semestrul”

- ECN francez: „<1 zi/săptămână”

### **Pag. 1095, Tabel**

#### *PEF (debit expirator de vârf)*

- text ECN: „60-80 mmHg”, „<60 mmHg”
- ECN francez: „60-80%”, „<60%”

#### *Frecvența cardiacă normală în funcție de vîrstă*

- text ECN: „2-8 ani<11/min”
- ECN francez: „2-8 ani<110/min”

### 75. Boli de nutriție la copil

#### **Pag. 1109, I. Diagnostic clinic, sindromul cardinal**

- text ECN: „polidipsie (datorată glicozuriei)”
- ECN francez: „polidipsie (datorată poliuriei)”

#### **Pag. 1111, IV. Management pe termen lung, obiective**

- text ECN: „evitarea hiperglicemiei postprandiale tardive sau nocturne”
- ECN francez: „evitarea hipoglicemiei postprandiale tardive sau nocturne”

## **MEDICINĂ INTERNA**

### 78. Patologii autoimune

#### **Pag. 1137, Imunoglobulina monoclonală**

- text ECN: „Un pic IgM trebuie să evoce boala Waldenstrom”
- ECN francez: „Un peak IgM trebuie să evoce boala Waldenstrom”
- text ECN: „Un pic IgG, IgA sau IgD”
- ECN francez: „Un peak IgG, IgA sau IgD”

## **DERMATOLOGIE**

### 80. Infecții cutaneo-mucoase bacteriene și micotice

#### **Pag. 1170, Complicații**

- text ECN: „Complicații hemoragige”
- ECN francez: „Complicații locale”

## **ENDOCRINOLOGIE-DIABET-BOLI METABOLICE**

### 83. Obezitatea la adulți

#### **Pag. 1276, I. Indice de masă corporală**

- text ECN: „30-34,5 kg/m<sup>2</sup>”
- ECN francez: „30-34,9 kg/m<sup>2</sup>”

## **CHIRURGIE UROLOGICĂ**

### 84. Infecțiile urinare la adult

#### **Pag. 1286, ECBU**

- text ECN: „leucocituri >10/mm<sup>3</sup> ou 10<sup>4</sup>/ml”
- corect: „leucocituri >10/mm<sup>3</sup> sau 10<sup>4</sup>/ml ”
- text ECN: „bacteriuri > 105 UFC/ml”

- corect: „bacteriurie  $> 10^5$  UFC/ml”

### **Pag. 1287**

- text ECN: „asocierea dintre o bacteriurie 103 UFC/ml și o leucociturie  $\geq 104/\text{ml}$  este un indiciu solid de infecție”
- corect: „asocierea dintre o bacteriurie  $10^3$  UFC/ml și o leucociturie  $\geq 104/\text{ml}$  este un indiciu solid de infecție”

### **Pag. 1291**

#### *Acțiunea progesteronului*

- text ECN: „favorizează refluxul vezico-uretral”
- ECN francez: „favorizează refluxul vezico-ureteral”

### **VII. Infecțiile urinare nosocomiale, prevenție**

- text ECN: „sac colector în poziție reclivă”
- ECN francez: „sac colector în poziție declivă”

### **Pag. 1292, VIII. Leucocituria**

- text ECN: „leucocite  $> 104/\text{ml}$ ”
- corect: „leucocite  $> 10^4/\text{ml}$ ”

### 87. Patologia tumorala benignă și malignă a aparatului uro-genital masculin

### **Pag. 1317, tabel Management, Inhibitor al 5-alfa-reductazei, Particularități**

- text ECN: „Diminuează nivelul de PSA cu 2”
- ECN francez: „Diminuează nivelul de PSA la jumătate”

### **Pag. 1319, III. Diagnostic, explorări biologice**

- text ECN: „dozaj normal, a fi urmat de depistarea manuală”
- ECN francez: „dozaj normal, a fi urmat de depistarea anuală”

## **NEFROLOGIE**

### 88. Insuficiența renală acută și cronică

### **Pag. 1356, tabel Reguli de nefroprotecție**

- text ECN: „controlul aportului de sare mai ridicat de 6 g/zi”
- ECN francez: „controlul aportului de sare mai puțin de 6 g/zi”

## **HEMATOLOGIE-ONCOLOGIE**

### 90. Anemia

### **Pag. 1376, I. Definiție**

- text ECN: „VEM 81-90: anemie normocitară”
- ECN francez: „VEM 81-99: anemie normocitară”

### 92. Mielomul multiplu

### **Pag. 1394**

### *V. Evaluarea masei tumorale și a factorilor de prognostic negativ, Stadiu III*

- text ECN: „ $> 10^{12}$  celule/ $\text{m}^2$ ”
- ECN francez: „ $> 1,2 \times 10^{12}$  celule/ $\text{m}^2$ ”

## *Factori de prognostic negativ, indice prognostic internațional, stadiu II*

- text ECN: „sau  $\beta2-m \geq 3,5 \text{ mg/l}$  și albumină  $< 5,5 \text{ mg/l}$ ”
- ECN francez: „sau  $-m \geq 3,5 \text{ mg/l}$  și  $< 5,5 \text{ mg/l}$ ”

## **II. Contradicții și mențiuni**

### **CARDIOLOGIE**

**Pag. 35, Natura ritmului:** unda  $P \leq QRS$ , unda  $P \geq QRS$  se referă la numărul undelor P.

**Pag. 40, Indicațiile anticoagulantelor,** la CHADS<sub>2</sub>=1 și CHDS<sub>2</sub>=0 doza de aspirina este 250 mg/zi” , diferit față de pag. 133, *Fibrilarea atrială*, unde la CHADS<sub>2</sub>=1 și CHADS<sub>2</sub>=0 doza de aspirină este 75-325 mg/zi.

**Pag. 77, Complicațiile chirurgiei,** insuficiența renală acută nu este o complicație digestivă

**Pag. 89, Tabel Factorii de prognostic negativ,**  $VO_2 < 14 \text{ ml/kg/min}$  nu este factor clinic

**Pag. 90, digitalice,** indicate în NYHA IV, iar în tabel apar la NYHA III și IV

**Pag. 93, Bioproteze,** durata lor de viață este de 8-15 ani, diferit față de pag. 94, tabel Bioproteze, durată de viață 8-20 ani

**Pag. 96, Tabel,** nu este menționat la ce se referă valorile numerice

**Pag. 113, III. Bilaț clinic,** semnele de insuficiență cardiacă dreaptă apar și la semne funcționale, și la semne fizice

**Pag. 113, II. Fiziopatologie,** ventriculul stâng se dilată pentru a face față supraîncărcării diastolice fără hipertrofie compensatoare, în contradicție cu *Bilaț paraclinic, ECG*, hipertrofie ventriculară stângă

**Pag. 119, Schemă,**  $TV > 4 \text{ ESV consecutive}$ , diferit față de pag. 31, *Extrasistole ventriculare*, unde la peste 3 ESV consecutive se vorbește de tahicardie ventriculară

**Pag. 128,** tratamentul fibrinolitic al accidentului vascular cerebral ischemic trebuie instituit în primele 3 ore, diferit de pag. 254, *Tratamentul antitrombotic în infarctul cerebral* indicat în caz de infarct cerebral datând de mai puțin de 4 ore și 30 minute

**Pag. 131, tranziția AVK-heparină,** oprirea heparinei de la primul INR eficient, diferit de pag. 210, *Tratamentul curativ*, tratamentul cu heparină sau cu inhibitori ai factorului Xa va fi oprit după obținerea a două valori INR optime.

**Pag. 138,** s-a uitat trecerea titlului Diuretice de ansă, se trece direct la descrierea lor

### **REANIMARE MEDICALĂ**

**Pag. 218, Reanimarea specializată,** lidocaina nu mai este recomandată ca tratament antiaritmice, nici chiar în caz de ischemie miocardică, în contradicție cu pag. 70, *Complicații precoce, tahicardia ventriculară*, soc electric extern (...) după eșecul tratamentelor medicamentoase (lidocaină, betablocante, amiodaronă)

### **BOLI INFECȚIOASE**

**Pag. 311, Examinări complementare,** “probele pentru analizele microbiologice vor trebui realizate înainte de orice antibioterapie, cu excepția cazurilor de soc septic și de purpura fulminans.”, diferit de pag. 223, *Întrebări frecvente*, “Este necesară aplicarea unei antibioterapii fără prelevare microbiologică, sub pretextul prezenței unei stări de soc septic? Nu, doar în caz de purpura fulminans. La nevoie, se pot preleva hemoculturi și uroculturi în câteva minute.”

**Pag. 403, Examen clinic,** hipotonie globilor oculari este menționată la deshidratare extracelulară, diferit de pag. 1049, unde apare la deshidratare intracelulară

### **CHIRURGIE VISCERALĂ**

**Pag. 513, Diagnostic,** creșterea lipazemiei apare ca semn clinic, deși este paraclinic

## **GINECOLOGIE-OBSTETRICĂ**

**Pag. 526,** *Tratarea hipertensiunii arteriale*, reumplere vasculară moderată (fără restricții hidrice, chiar în caz de edeme), în contradicție cu **pag. 526**, nu se recomandă expansiunea volemică sistematică

**Pag. 585,** *Tratamentul pentru polipi endometriali*, histeroscopia operatorie cu rezecția fibromului nu are legătură cu polipii

## **REUMATOLOGIE**

**Pag. 628,** *Erori de evitat, Ac anti-CCP*, la infecții cronice apar și gripa și mononucleoza infecțioasă, care nu sunt afecțiuni cronice

## **CHIRURGIE ORTOPEDICĂ**

**Pag. 655,** *Fracturi cervicale reale*, clasificarea Garden apare la pseudoartroză, deși reprezintă clasificarea de la fracturi

## **PEDIATRIE**

**Pag. 1080,** *Convulsii febrile simple, definiție*, eveniment ce apare la un sugar sau copil, între 3 luni și 5 ani, diferit de *clinic*, unde scrie că apare la un sugar de peste 12 luni

## **ENDOCRINOLOGIE-DIABET-BOLI METABOLICE**

**Pag. 1226, V.2.** *Tratament de substituție cu levotiroxină*, până la normalizarea TSH, diferit de **V.3. Durata tratamentului:** pe viață

## **NEFROLOGIE**

**Pag. 1350,** *Principalele cauze, Obstructive=postrenale, anamneză*, hematuria microscopică apare ca semn funcțional urinar